

INFORMACION SOBRE CIRUGIA AMBULATORIA DE HEMORROIDES

Una hemorroide se denomina a la existencia de vasos sanguíneos dilatados y protuberantes dentro y en el entorno al ano en la parte baja del recto. Las hay de dos tipos, "Externas" e "Internas", según donde estén situadas.

El tratamiento quirúrgico se debe de realizar siempre que el mejoramiento de hábitos y tratamiento médico no sea suficiente o cuando ya existe inicio de las complicaciones. La hemorroidectomía es la cirugía mas empleada y con mejores resultados finales para quitar las venas que se han hinchado o dilatado alrededor del ano.

Para la intervención de hemorroides se usa anestesia local o raquídea, de tal manera que no se sienta dolor durante el procedimiento pero, en algunos casos, dicho procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general, con el paciente dormido y sin sentir dolor.

Tras la cirugía, y siempre bajo la supervisión del medico responsable de su intervención, usted podrá marchar a domicilio especificándose en el informe de alta el tratamiento que deberá seguir en los siguientes días.

Recomendaciones / Información al alta:

1.- Tras una intervención ambulatoria de hemorroides, normalmente existe dolor local que se puede tratar con un analgésico, según indicación médica expresa en el informe de alta.

2.-Es normal que se manche el aposito o que presente algún pequeño sangrado a través de la herida quirúrgica en las primeras horas o días inmediatos a la intervención, debiendo consultar siempre que exista sangrado importante de la misma.

3.-Normalmente, la zona intervenida se encuentra inflamatoria en los días siguientes a la operación debiéndose consultar en caso de inflamación importante, dolor no controlado o la existencia de fiebre.

4.-Diariamente pasara para realización de curas en su Centro de Salud o en la consulta de enfermería de nuestro centro y según primera valoración se le iran dando las indicaciones oportunas para próximas curas.

5.-Se debe evitar el estreñimiento por lo que se recomienda una dieta rica en fibra, con ingesta abundante de frutas y verduras, y abundantes líquidos (agua, zumos, etc..., pero nunca bebidas alcohólicas).

6.-Realizar baños de asiento con agua templada varias veces al día y tras hacer deposiciones.

7.-Como tras otras intervenciones, es aconsejable pasear, lo cual mejora la circulación sanguínea, favorece la cicatrización de las heridas, y aumenta la motilidad intestinal.

DEBE ACUDIR A LOS SERVICIOS SANITARIOS INMEDIATAMENTE CUANDO APAREZCA:

- Temperatura superior a 38°C
- Dolor que no remite con tratamiento medico (tanto repo so como medicación)
- Enrojecimiento, hinchazón y/o apósito manchado de líquido purulento.

SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL
IDCSALUD HOSPITAL ALBACETE