


LESCENTE

El empleo de
as adictivas
con el fin de
linar.



La adicción a sustancias como el tabaco o el cannabis es uno de los principales riesgos de esta etapa de la vida.

Por parte de los
los 14 y los 18
hábitos de vida
na que algo más
de los jóvenes
de estos com-
, en la mayoría
den prevenir.

, el porcentaje
con problemas
situaba entre el
Este aumento
últimos años
, a su juicio, por
culturales y están
lacionadas con
ocio de los jóve-
as o el alcohol.

que se debatió
e que los pedia-
enores hasta los
consultas. Hasta
den hasta los 16.

El correcto tratamiento del TDAH reduce las toxicomanías en la juventud

Aunque la mayoría de los jóvenes con conductas problemáticas no presenta ninguna patología psiquiátrica de base, hay ciertos cuadros clínicos con los que se relaciona, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Tal y como apuntó **Javier Quintero, psiquiatra de la Fundación Jiménez Díaz**, "los adolescentes que no han sido diagnosticados ni tratados adecuadamente durante la infancia no sólo tienen más probabilidades de desarrollar problemas de conducta violenta o fracaso escolar, sino que también presentan 3-4 veces más riesgo de abuso de drogas y el doble de sufrir accidentes de tráfico debido, fundamentalmente, a su impulsividad", por lo que apunta la importancia de un diagnóstico precoz.