

Todo lo que puedes comer
Ahora en Madrid

¡CONSÍGUELO!

desde **6€**

GROUPON CityDeal

Nacional

La mitad de los hombres mayores de 50 años padece hiperplasia benigna de próstata, según expertos

(SALUDALIA) 18/10/2010

Entre el 50 y el 60 por ciento de los médicos de Atención Primaria en España no asume "toda su responsabilidad" en el diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata (HBP), según ha advertido el doctor José María Molero, médico de Atención Primaria del Centro de Salud San Andrés de Madrid, en una reunión sobre el tratamiento de esta enfermedad organizada por GlaxoSmithKline (GSK).

Para Molero, las competencias del médico de familia en relación a la HBP "son el manejo diagnóstico, por una parte -que realizan la mayoría de médicos- y el manejo terapéutico de los pacientes que no son graves, es decir, los pacientes leves y moderados".

"Los pacientes que detectamos, en mayor medida, son los que presentan una patología moderada, ya que aquellos con síntomas leves son difícilmente detectables, al no ser referidos de forma rutinaria por los pacientes", ha explicado Molero.

SEMERGEN, semFYC y SEMG, junto con la Asociación Española de Urología (AEU), han alcanzado un consenso sobre el diagnóstico, tratamiento y derivación al urólogo de los pacientes con HBP.

"Ahora, el Servicio Madrileño de Salud ha convertido este documento en un protocolo de actuación, asumido por la institución, que se ha implantado en todos los centros de salud y en las historias clínicas de los pacientes", apunta este experto.

"Esta nueva herramienta -dice- aporta a los médicos de familia unas recomendaciones avaladas por la evidencia publicada y seguridad para asumir el manejo del 70 por ciento de estos pacientes, ya que indican como diagnosticar, cuál es el tratamiento adecuado en función del diagnóstico y cuándo se deben derivar al urólogo".

Según la doctora Carmen González-Enguita, jefa de Servicio de Urología de la **Fundación Jiménez Díaz**, la HBP es una enfermedad crónica que afecta al 50 por ciento de los hombres de más de 50 años y a casi todos los mayores de 80. "Podemos afirmar -dice- que es una patología que padecerán todos los hombres a lo largo de su vida".

NUEVOS TRATAMIENTOS

Desde el punto de vista del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, tanto los médicos de Atención Primaria como los urólogos, cuentan con nuevas opciones terapéuticas, como pone de manifiesto el estudio 'CombAT' (Combination therapy with Avidart and tamsulosine), el mayor estudio realizado durante cuatro años en estos pacientes.

En 'CombAT' se estudia la terapia de combinación de dutasterida con tamsulosina y se demuestra una reducción significativa del 66 por ciento del riesgo de retención aguda de orina (RAO) o de cirugía relacionada con la HBP frente a tamsulosina en monoterapia a los cuatro años. A su vez, según este estudio, el riesgo de progresión clínica de la enfermedad también es menor, reduciéndose hasta en un 44 por ciento.

Para González-Enguita, "los resultados de este estudio proporcionan nueva evidencia que supondrá una gran revolución en el tratamiento de la HBP en pacientes con sintomatología de moderada a grave". "Esta nueva alternativa nos aporta una evidencia muy robusta en el tratamiento, a corto y largo plazo, de los pacientes con sintomatología por HBP y factores de progresión y de la evolución de las complicaciones de la HBP en estos pacientes, y nos permite identificar aquellos casos que mejor responderán a este tratamiento", anota esta doctora.

A su juicio, la terapia combinada va a suponer "un cambio en la cultura sanitaria ya que se va a modificar el escenario del tratamiento con unos beneficios muy claros para un grupo amplio de pacientes y, también, para los médicos, que cuentan con una nueva alternativa en primera línea de tratamiento".

publicidad

-70%
en Madrid

¡Ahorra ya! ▶

GROUPON CityDeal

secciones

Nacional

Internacional

Política Sanitaria

Avances en Medicina

Industria

Miscelánea

Hemeroteca

secciones

Más Noticias

18/10/2010 En España han fallecido casi 85.000 personas por enfermedades cardiovasculares en lo que va de año.

18/10/2010 Los pediatras advierten de un incremento de enfermedades importadas a España por niños que viajan o emigran.

18/10/2010 Una de cada tres mujeres nunca se ha realizado una citología.

18/10/2010 La mitad de los hombres mayores de 50 años padece hiperplasia benigna de próstata, según expertos.

18/10/2010 Médicos y pacientes discrepan sobre la pérdida de movilidad que causa la esclerosis múltiple.

18/10/2010 La SED regula el uso de tiras reactivas a través de un documento de consenso para evitar su uso indiscriminado.

18/10/2010 El miedo, encontrarse bien y la "falta de confianza" en la técnica, las "excusas" para no hacerse una mamografía.

18/10/2010 El 30% de las mujeres que se somete a una cirugía de aumento mamario lo hace por una malformación de la mama.