

**ADSL 10 Mb con Aula 365**  
Este curso ayudar a tus hijos puede ser más sencillo.

canal software ofrecido por  
**KNOSYS2**  
BLUE micronet

.MOBI
CHANCE
LATAM
EPSOCIAL
MOTOR
PORTALTIC
.ES

europapress.cat

SOCIETAT

Dimarts, 14 de setembre 2010
última hora
En aquesta secció

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

POLÍTICA
INTERNACIONAL
ECONOMIA
SOCIETAT
ESPORTS
SUCCESSOS
TRIBUNALS
CULTURA
GENT
OCCITAN
AGRO
SERVEIS

**SOCIETAT >**

## Els pacients operats de càncer de pròstata tenen una qualitat de vida pitjor, segons un estudi

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Imprimiu

COMPARTIU AQUESTA NOTICIA:

0 tweets

Els pacients amb càncer de pròstata sotmesos a una operació quirúrgica per extirpar el tumor són els que tenen una qualitat de vida pitjor als tres anys de la intervenció, amb un nombre més gran d'efectes secundaris, davant els pacients tractats amb radioteràpia d'alta precisió i braquiteràpia.

Així ho constata l'estudi del Grup Espanyol Multicèntric del Càncer de Pròstata Clínicament Localitzat, presentat aquest dilluns pel cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'institut Català d'Oncologia (ICO), Ferran Guedea, al començament del XIX Congrés de la Societat Europea de Radiologia Terapèutica i Oncologia (Estro), que se celebra fins divendres a Barcelona amb gairebé 6.000 oncòlegs i científics de tot el món.

La investigació compara les tres opcions terapèutiques més comunes a l'hora d'atacar un càncer de pròstata i és conclouent quan destaca que els efectes més negatius posteriors els suposa la cirurgia radical de la pròstata, que Guedea ha admès que és la més etsesa.

En la ment d'alguns professionals i de molts pacients persisteix la idea que la cirurgia del tumor és l'eina més eficaç per tractar un càncer. Tot i això, Guedea ha insistit que la resta de teràpies, conegudes com a conservacionistes, aconsegueixen exactament la mateixa eficàcia.

Així, l'estudi -iniciat el 2000-- compara la qualitat de vida de 435 pacients tractats amb prostatectomia -cirurgia--, braquiteràpia -llavors de iode 125-- i radioteràpia d'alta precisió. L'estudi s'ha fet a través de tres entrevistes telefòniques de 45 minuts dutes a terme abans del tractament i el primer mes, el tercer i el sisè al cap d'un any; i als dos i als tres anys després del tractament.

El treball és conclouent a l'hora de remarcar que els pacients operats van patir significativament més problemes d'incontinència urinària als tres anys i més disfuncions sexuals. La braquiteràpia i la radioteràpia, en canvi, van causar moderats símptomes urinaris irritadors obstructius i també van afectar la funció sexual, però una mica menys.

Guedea ha remarcat les "grans diferències", i ha lamentat que "moltes vegades els pacients escullen tractaments que causen més efectes secundaris" guiats per la seva percepció.

A l'estudi, han participat una desena de centres espanyols: l'ICO, l'Hospital de Bellvitge, l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de l'Hospital del Mar, la Fundació Puigvert, l'Hospital Sant Pau de Barcelona, l'Onkologikoa a Sant Sebastià (Institut Oncològic de Guipúscoa), l'Hospital Carlos Haya de Màlaga, l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, l'Hospital General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), el Centro Oncológico de Galicia, a A Corunya, i l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Més notícies    Més llegides

- Educació aconsella les famílies com omplir la setmana blanca de febrer en una web
- La NASA estudia fer llançaments en horitzontal
- Condemnen un bar de Calella a pagar a l'SGAE per usar la televisió per ambientar el local
- Descoberts 14 nous objectes en el Sistema Solar
- Recomanen reduir la quantitat de desinfectants en les piscines cobertes
- Catalunya és una de les comunitats més afectades per la reforma de l'accés a la universitat
- Aguirre i Montilla, els presidents autonòmics amb més pes a internet
- Els ramaders ja poden demanar les ajudes per a la vacunació de la llengua blava

L'ACTUALITAT MÉS VISITADA A WWW.EUROPAPRESS.CAT