

¿Quién fue el segundo hombre en llegar a la luna?
La respuesta a solo un clic.
Datos curiosos Google



☀ Temperatura 8°C - 45°F
\$ 12.32 - 12.59

El Diario **mx**
Domingo

09:38 hrs | Lunes 15 de Marzo de 2010 | Ciudad Juárez, Chihuahua, M

PORTADA LOCAL EL PASO ESTADO NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES

'Rebeldes' por estreñimiento

Agencias | 13-03-2010 | 20:07 | Domingo

Madrid. -Seguramente usted nunca se lo haya planteado. Pero deténgase un par de minutos a reflexionar si su hijo tiene problemas de conducta y, además, es estreñido. Pues, aunque aparentemente nada tenga que ver una cosa con la otra, lo cierto es que ambos factores están relacionados.

Los comportamientos problemáticos son más frecuentes en los niños y en los adolescentes con estreñimiento funcional que entre los que acuden con 'normalidad' al baño.

"El estreñimiento funcional en menores es un motivo frecuente de consulta y consiste en una alteración en la frecuencia, volumen, consistencia o facilidad de expulsión de heces, comenta Juan José Carballo, psiquiatría infantil de la **Fundación Jiménez Díaz** de Madrid.

Una investigación dirigida por Marieke van Dijk, de la Universidad de Amsterdam (Holanda), constata la elevada prevalencia de problemas emocionales y de comportamiento en los menores que no pueden o no quieren (en algunos casos es el propio niño el que retiene las heces) ir al 'retrete'.

La investigación, publicada en la revista 'Pediatrics', ha contado con la participación de 133 niños y adolescentes holandeses de cuatro a 18 años con estreñimiento funcional del Hospital Infantil Emman.

Tipos de problemas

Los científicos recogieron información sobre los problemas de conducta internalizantes (síntomas de ansiedad y depresión) y los

externalizantes (conductas opositoras, desafiantes, de hiperactividad y conducta antisocial) a través de un cuestionario que hicieron llegar a los padres.

Los datos revelan que hasta un 36.8% de chicos y chicas estreñidos presentaba problemas de conducta. La duración de su estreñimiento se relacionaba también con un aumento del riesgo de padecer estas alteraciones.

Los menores con estreñimiento funcional que también presentaban incontinencia urinaria nocturna son los que mayores puntuaciones obtuvieron en comportamiento problemático”, aclaran los autores en su investigación.

El doctor Carballo cree que pese a los datos hay que destacar algunas limitaciones del estudio. “Debido a su diseño no pueden establecerse relaciones de causalidad. Por otro lado, la valoración de los trastornos de conducta únicamente a través de un cuestionario y no mediante una entrevista clínica con los propios pacientes es una importante limitación. La obtención de más información, como del funcionamiento escolar, favorecería la investigación”.

[✉ Enviar](#)[🖨 Imprimir](#)[↩ Compartir](#)[💬 Comentar](#)**[Urgencias Dentales Madrid](#)**

De Lunes a Domingo 24 horas Asistencia
Profesional de Urgencias

[Cirugía Estética Orejas](#)

Otoplasia, Corrección Orejas en Asa
Especialistas en Cirugía Plástica.

Anuncios 

El Diario **Publicaciones Paso del Norte, S.A. de C.V. Ciudad Juárez, Chihuahua**[Directorio](#) | [¿Quiénes Somos?](#) | [Publicidad](#) | [El Clima](#) | [Suscripciones](#) | [Política de Privacidad](#) |