

Par **Impar**

Noticias

Reducir los niveles de colesterol implica un descenso del 35 por ciento del riesgo cardiovascular

Se recomienda el uso de los nuevos tratamientos, como la coadministración de estatina más inhibidor de la absorción intestinal, ya que actúa de forma eficaz sobre las dos fuentes de procedencia del colesterol: la hepática y la intestinal.

Madrid, 4 abril 2007 (mpg/AZprensa.com)

Pedro Mata, responsable de la Unidad de Lípidos de la **Fundación Jiménez Díaz** de Madrid y presidente de la Fundación Española de Hipercolesterolemia (FHF), señaló recientemente que al reducirse los niveles de colesterol, se reduce también el riesgo cardiovascular en un 35%.

A esta conclusión se llegó durante el foro de expertos sanitarios reunido por la FHF, al analizar la situación actual del infratratamiento del colesterol en España y plantear cambios para su mejor situación.

“El control del colesterol continúa siendo una asignatura pendiente en los planes de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, con el consiguiente aumento de los costes y de la carga de la enfermedad”, señaló Mata.

Los expertos indicaron que para optimizar la eficacia de los recursos invertidos en la prevención de los riesgos cardiovasculares, es necesario identificar a los pacientes coronarios, diabéticos o con hipercolesterolemia familiar y dedicarle una especial atención en los programas públicos de salud, sin embargo, actualmente no existen estrategias estatales dirigidas a detectar estos grupos, señaló la FHF.