

TEST DEL ALIENTO PARA DETECTAR HELICOBACTER PYLORI

***PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS
SIGUIENTES INDICACIONES***

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La prueba debe realizarse por la mañana y en ayunas (tanto alimentos como bebidas) desde la noche anterior durante un mínimo de 8 horas.
- Abstenerse de fumar al menos 8 horas antes de la realización de la prueba.
- Durante el mes anterior al test NO TOMAR tratamiento antibiótico, siempre consultando previamente a su médico.
- Durante los 15 días previos NO TOMAR OMEPRAZOL, LANSOPRAZOL, ESOMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, RABEPRAZOL... u otro inhibidor de la bomba de protones o con sales de bismuto, siempre consultando previamente a su médico.
- SI está permitido tomar ranitidina, cimetidina, famotidina, nizatidina, ...almax y medicación crónica como son los tratamientos para colesterol, diabetes, tiroides, tensión
- SI está permitido lavarse los dientes.
- SI está permitido beber agua.
- Informe a su médico si:
 - Ha sufrido una extirpación parcial de su estómago (gastrectomía).
 - Está embarazada o en periodo de lactancia.

Observaciones: *La prueba dura 40 minutos*