

Principals camps d'actuació de l'Institut Quirúrgic

Avaluació mèdica inicial


Els nostres especialistes (cirurgià, endocrí i nutricionista) realitzaran l'estudi individualitzat del teu cas, en el qual es determinarà si et pots sotmetre a una cirurgia de l'obesitat. En cas que sigui així, analitzaran quin serà el tipus de cirurgia que millor s'adapta al teu cas.

Així mateix, decidiran sobre la necessitat de valoracions addicionals a càrrec d'especialistes d'altres unitats (cardiologia, pneumologia) en cas d'haver d'estabilitzar la teva salut abans de la cirurgia.

Tractaments quirúrgics laparoscòpics i cirurgia invisible-SILS

Cada pacient, d'acord amb les seves característiques personals, pot requerir un tipus de cirurgia o un altre. Les tècniques més utilitzades actualment són:

- Bypass Gàstric Laparoscòpic (BGL)
- Gastrectomia tubular per laparoscòpia (*Sleeve Gastrectomy*)
- Derivació biliopancreàtica (*Switch* o encreuament duodenal)



Control i seguiment postquirúrgic

El tractament de la Cirurgia de l'Obesitat no acaba amb la intervenció quirúrgica; requereix un seguiment continu que controli la pèrdua de pes i l'estat nutricional. En aquesta unitat, els endocrins i nutricionistes et faran un seguiment. Aquesta cirurgia implica canvis importants en els hàbits alimentaris que requereixen un període d'adaptació en què estaràs acompanyat en tot moment dels nostres especialistes.

Hospital
quirónsalud
Barcelona

Hospital Quirónsalud Barcelona
Institut Quirúrgic Lacy (IQL)
Planta 2
Plaça Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
93 255 40 25

Quirónsalud, la salut persona a persona.


Més de 100 hospitals, instituts i centres mèdics dedicats a la teva salut en 13 regions:
Andalusia | Aragó | Balears | Canàries | Castella-la Manxa | Catalunya | Comunitat Valenciana | Extremadura | Galícia | Madrid | Múrcia | Navarra | País Basc

quironsalud.es



Endocrinologia i Nutrició

Cirurgia de l'obesitat



Hospital **quirónsalud**
Barcelona

Cirurgia de l'obesitat. Cirurgia de cicatrius mínimes

Quan perdre pes no és només una decisió estètica
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat l'obesitat com la major epidèmia del segle XXI. Actualment hi ha més de 700 milions d'adults obesos a tot el món

Quan a Cirurgia de l'Obesitat de l'Institut Quirúrgic Lacy (IQLacy) de l'**Hospital Quirónsalud Barcelona** parlem d'obesitat no ens referim només a una qüestió estètica, sinó que parlem dels problemes de salut que tenen els pacients obesos: uns problemes que s'inicien des de l'adolescència.

L'excés de pes sol reduir la capacitat per desenvolupar amb normalitat activitats de la vida diària com ara caminar, pujar escales, pentinar-se o cordar-se les sabates i, a causa de l'obesitat, sorgeixen altres malalties com la diabetis, la hipertensió arterial, l'artrosi o un augment de la incidència de certs tipus de càncer.er.

A la Unitat de Cirurgia de l'Obesitat de l'IQLacy, comptem amb un grup interdisciplinari d'especialistes (cirurgians, endocrins, nutricionistes) amb experiència, coneixement i actitud de servei que valoraran el seu cas de forma individualitzada, i amb una infraestructura i tecnologia punteres; les sales d'operacions intel·ligents permeten el tractament quirúrgic del pacient utilitzant tècniques quirúrgiques avançades, la cirurgia bariàtrica laparoscòpica i la cirurgia invisible-SILS, que han demostrat ser beneficioses per al pacient obès, ja que amb elles es poden realitzar intervencions amb cicatrius mínimes i amb un temps reduït d'hospitalització.



Cirurgia bariàtrica laparoscòpica Cirurgia SILS

El primer pas per saber si existeix obesitat o no és conèixer el seu Índex de Massa Corporal (IMC).

Calcula el teu IMC (Índex de Massa Corporal)

$$\text{IMC} = \frac{\text{Pes (kg)}}{\text{Estatura}^2 \text{ (m}^2\text{)}}$$


L'IMC és només una fórmula matemàtica que relaciona el teu pes i la teva estatura.

- IMC igual o superior a 25: sobrepès
- IMC igual o superior a 30: obesitat
- IMC igual o superior a 40: obesitat mòrbida

L'obesitat mòrbida respon malament als tractaments convencionals de l'obesitat (dieta, exercici, medicaments per aprimar, etc.). Totes les publicacions mèdiques estan d'acord en què, avui dia, l'únic tractament eficaç per a l'obesitat mòrbida és la cirurgia. Si tens un IMC de 40, o de 35 amb malalties greus (diabetis, hipertensió, etc.), pot plantejar-te realitzar una intervenció de cirurgia de l'obesitat.





CIRURGIA DE L'OBESITAT. INSTITUT QUIRÚRGIC LACY (IQL)
QUADRE MÈDIC

Cirurgia:
Dr. Antonio de Lacy Fortuny
Dr. José M. Balibrea del Castillo

Endocrinologia:
Dra. Ana de Hollanda

Nutrició:
Violeta Moizé
Amparo Carrasco
Marta Comas

Secretaria:
Mónica Toullot
Bella Soldevila