

Preparación para test de aliento para la detección de **HELICOBATER PYLORI**

Para obtener un resultado fiable, le rogamos que siga y cumpla las siguientes instrucciones:

- Esta prueba NO se debe realizar a pacientes que hayan recibido y/o hayan estado sometidos en las 4 semanas previas a:

Terapia antibióticas vía oral o inyectada.

Protectores de estómago tipo inhibidos de la bomba de protones: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol (por ejemplo: Nexium, Losec, Parizac, Miol, Emeproton, Gastrimud, Ceprandal, Norpramin, Omapren, Pepticum, Opiren, Estomil, Monolitum, Proulco, Nucleosina, Pantectal, Ulcotental, Anagastra, etc.).

- Está permitido tomar otros antiácidos/protectores gástricos, consultándolo siempre con su médico.
- Estar en ayuno (sólo podrá ingerir un poco de agua) desde la noche anterior.
- No lavarse los dientes.
- No fumar, comer chicle, ni realizar ejercicio físicos, 30 minutos antes del inicio de la prueba, ni durante la misma (su duración es de 1 hora).
- Se recomienda consultar a su ginecólogo en caso de estar embarazada y/o en periodo de lactancia.

VOLANTES:

Recuerde acudir al centro con los volantes cumplimentados y autorizados, en caso de ser necesario (consulte con su compañía si es necesario autorizar los volantes, ya que no todas las compañías lo cubren.)

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con el Laboratorio de análisis clínico