


RECOMENDACIONES TRAS REALIZACIÓN DE HISTEROSCOPIA

DEBE SABER:

El procedimiento que se le ha realizado le permite a su ginecólogo/a visualizar el útero por medio de una endoscopia y realizar el diagnóstico y el tratamiento de gran parte de patologías uterinas.



CUIDADOS GENERALES

DURANTE UNA SEMANA DEBE EVITAR:

- Baños de inmersión.
- Uso de tampones higiénicos
- Relaciones sexuales.
- Ejercicio físico intenso.

ES NORMAL QUE PRESENTE:

- Sangrado vaginal de intensidad decreciente, de 7 a 30 días tras la intervención.
- Molestias abdominales tipo “menstrual”, para lo que puede tomar analgésicos habituales: Nolotil, Paracetamol, Ibuprofeno, etc.
- Leve sensación de quemazón al orinar que cederá, en la mayoría de los casos, con el incremento de la ingesta de líquidos.
- Leve sensación de cansancio.
- Sensación de “hinchazón” abdominal transitoria.

OBSERVE

DEBE ACUDIR A URGENCIAS DE NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO SI PRESENTA:

- Temperatura igual o superior a 38°C
- Flujo vaginal maloliente.
- Si tuviese sangrado mayor de lo habitual que no cede con el reposo.
- Dolor que no cede con la analgesia aconsejada.