

ORDENES PREOPERATORIAS PARA INTERVENCIÓN DE CATARATAS (Dr. BENEYTO)

CUIDADOS GENERALES

- Para operarse debe haber firmado el **CONSENTIMIENTO INFORMADO**, en el que se explica en qué consiste la cirugía de catarata.
- Debe acudir en **AYUNAS de 6 horas**.
- Se debe tomar por la mañana su medicación para la tensión con un sorbito de agua.

- **RESPECTO AL TRATAMIENTO ANTES DE LA CIRUGÍA:**

*Desde **2 DIAS ANTES** de la cirugía se pondrá un colirio antibiótico:

-**EXOCIN colirio**: 1 gota cada 8 horas

***EL MISMO DIA de la intervención** desde **2 horas antes** de la misma se pondrá un colirio dilatador de la pupila cada 30 minutos:

-**CICLOPLÉJICO 1% colirio**: 1 gota cada 30 minutos.

- **RESPECTO AL TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:**

Después de la cirugía utilizará los siguientes colirios:

- **EXOCIN colirio**
- **MAXIDEX colirio**
- **ACULAR colirio**

La dosis de estos colirios se la indicará el cirujano después de haber acabado la intervención.

RECUERDE

1. Debe lavarse cuidadosamente las manos antes de ponerse cualquier colirio o pomada. El personal de Enfermería les explicará la técnica correcta de ponerse la medicación.
2. Si coinciden dos clases de colirios a la misma hora, es necesario esperar cinco minutos entre cada aplicación.
3. Los colirios deben de conservarse en un lugar fresco. Algunos precisan frigorífico.
4. Es muy importante ponerse las gotas que ha prescrito el médico para evitar cualquier infección o inflamación en el ojo operado.