

PREPARACIÓN PREOPERATORIA PARA INTERVENCIÓN DE CATARATAS (Dr. ANTOLIN)

CUIDADOS GENERALES

- **Dp/ CICLOPLÉJICO colirio – 1 envase** **TOBRADEX colirio – 1 envase**
FENILEFRINA colirio – 1 envase **VIGAMOX colirio – 1 envase**
YELLOX colirio – 1 envase
- Debe adquirir los anteriores colirios antes del día de la intervención.
- El día de la misma debe acudir al hospital una hora antes de la prevista para la intervención, en ayunas (no ingerir alimentos sólidos ni líquidos desde 7 horas antes). Deberá tomar su medicación a la hora indicada con un sorbo de agua.
- **RESPECTO AL TRATAMIENTO ANTES DE LA CIRUGÍA:**
 - ***EL MISMO DIA de la intervención** Se empezará a instilar una gota de **CICLOPLÉJICO** y **FENILEFRINA** colirio en el ojo a intervenir cada 15 minutos desde una hora antes de la prevista para la intervención.
- **RESPECTO AL TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:**

El día de la intervención comenzará al llegar a su domicilio a instilar la siguiente medicación:

 - **-TOBRADEX colirio**
1 GOTTA CADA __ HORAS - __ DÍAS
1 GOTTA CADA __ HORAS - __ DÍAS
1 GOTTA CADA __ HORAS - __ DÍAS
1 GOTTA CADA __ HORAS - __ DÍAS
1 GOTTA CADA __ HORAS - __ DÍAS
 - **-VIGAMOX colirio – 1 gota cada 6 horas – 1 semana**
 - **-YELLOX colirio – 1 gota cada 12 horas – hasta revisión**

Durante este tiempo es conveniente evitar realizar esfuerzos físicos importantes o movimientos bruscos, agachar la cabeza por debajo de la cintura y dormir sobre el lado recién intervenido.

Durante los primeros días tras la intervención es normal que la visión sea borrosa y una sensación levemente punzante o de cuerpo extraño, así como que le resulte molesta la exposición a la luz intensa, por lo que podría considerar utilizar gafas de sol en el exterior.

 - **Revisión** el día siguiente de la intervención en consulta HOSPITAL TRES CULTURAS, día __ a las __
 - La siguiente **revisión** debe ser realizada en __ semanas