


## RECOMENDACIONES TRAS LA REALIZACIÓN DE HISTEROSALPINGOGRAFÍA

### DEBE SABER:

- La exploración que se le ha realizado nos dará información sobre la morfología de su cavidad uterina y nos permitirá valorar la permeabilidad de ambas trompas



- Una vez terminada la exploración, pueden persistir ciertas molestias. Le recomendamos que, si no es alérgica, **tome paracetamol**.
- Durante el primer día puede sufrir pérdidas vaginales. Son normales, son debidas al contraste previamente administrado y a la manipulación de la exploración.
- Debe **seguir el tratamiento antibiótico** que le haya recomendado su ginecólogo para la exploración.

### DEBE EVITAR:

- Es aconsejable **evitar mantener relaciones sexuales** durante las próximas 24 horas.
- Procure **evitar las aspirinas o el ibuprofeno** para el control del dolor.

## OBSERVE

**SIGNOS DE ALARMA:** Debe acudir a Urgencias si presenta los siguientes síntomas:

- **Dolor** que no se controla con la analgesia pautada.
- **Abdomen duro**.
- **Sangrado vaginal** que no cede en 24 horas.
- **Flujo vaginal maloliente**.
- **Fiebre (+38°C)**.
- **Signos de alergia al contraste:** picores generalizados (especialmente en cabeza y dedos, inflamación de cara o labios, dificultad para tragar, erupción o manchas en la piel, etcétera). Es muy raro que se produzca una reacción alérgica, ya que no suele haber paso de contraste al sistema vascular.

**En el departamento de radiología se le informará de cualquier duda**