

## Dar medicación con seguridad a nuestro hijo



### Como norma general:

- Debe de mantenerse la medicación fuera del alcance de los niños
- Mantenga la medicación en su envase, con la etiqueta en buen estado, y asegurándose que queda bien cerrado el envase
- Debe de realizar los tratamientos respetando las cantidades, dosis y duración que le han recomendado
- No tome medicación de otro niño o de otro adulto
- No utilice medicamentos caducados
- Ante cualquier duda de dosificación debe de consultar al médico



### Para darle la medicación a su hijo:

- Compruebe en medicamentos líquidos que la medicación tiene la dosis, concentración exacta.
- Utilice jeringuillas midiendo la cantidad exacta. En el caso de ser cantidades pequeñas utilice jeringuillas de 1-2 mililitros para poder medir con más exactitud.
- Para medir con exactitud tenga en cuenta que la goma negra del émbolo debe alinearse con la cantidad que debe de cargar
- No use cucharas de cocina.
- No prepare la medicación con poca luz, para reducir el riesgo de equivocaciones
- Para darle la medicación introduzca la jeringuilla en la boca y deje succionar poco a poco.
- Debe de hacerle saber que los medicamentos le ayudarán a mejorar y **que no son caramelos ni vitaminas.**
- Felicite a su hijo si se ha tomado de forma correcta la medicación.
- Ofrezca a su hijo agua o algún líquido para quitarle el mal sabor del medicamento.
- Si escupe la toma, espere 10 minutos y pruebe de nuevo.
- Lave la jeringa tras utilizarla, con agua caliente para que no queden restos de medicación





**ACUDA O URGENCIAS O CONSULTE AL MÉDICO DE FORMA INMEDIATA:**

- **Ante ingestión accidental de medicación o toma de dosis errónea**
- **Si presenta alguna reacción tras la toma del medicamento**
- **Debe siempre indicar qué ha tomado, llevar el medicamento**